

## گزارش یک مورد مدیاستینیت حاد ناشی از سوراخ شدگی مری بدنبال بلع استخوان ماهی

دکتر کورش شمیمی<sup>۱\*</sup>، دکتر شیرین حقیقی<sup>۲</sup>

۱. متخصص جراحی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲. پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

\*نشانی برای مکاتبه: تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، بیمارستان ولیعصر (عج)، بخش جراحی عمومی  
دریافت مقاله: فروردین هشتاد و پنج پذیرش برای چاپ: تیر هشتاد و پنج

### چکیده

سوراخ شدگی مری یک وضعیت حاد و وخیم بامیزان مرگ ومیر بالا است. سوراخ شدگی مری معمولاً "بدنبال اقدامات تشخیصی و درمانی مری ومعهده، بلع جسم خارجی و تروما ایجاد می شود. پیش آگهی بیماری به تشخیص به موقع و شروع اقدامات درمانی مناسب در ۲۴ ساعت اول بستگی دارد.

در این مقاله خانمی ۵۹ ساله و مبتلا به دیابت معرفی می شود که بدنبال بلع استخوان ماهی مدتی با تشخیص فارتزیت تحت درمانهای معمول بوده و چند روز بعد با بدتر شدن حال عمومی به بیمارستان مراجعه کرده است و علیرغم درناژ آبسه مدیاستن و امپیم با تابلوی *sepsis* و شوک سپتیک فوت نموده است.

**واژگان کلیدی:** مدیاستینیت حاد، سوراخ شدگی مری، استخوان ماهی

### مقدمه

مدیاستینیت شود که شروع هرچه سریعتر درمان می تواند پیش آگهی بیماری را بهبود بخشد.

### معرفی بیمار

بیمار، خانم ۵۹ ساله دیابتی باتشخیص آبسه حلق به بخش اورژانس بیمارستان منتقل شد. بیمار یک هفته پس از خوردن غذا احساس بلع استخوان ماهی کرده که اقدامات خانگی معمول صورت گرفته بود. روز بعد بیمار با اودینوفازی به درمانگاه مراجعه کرده و در آنجا

سوراخ شدگی مری، یک اورژانس جراحی است که بیشتر بدنبال اقدامات تشخیصی یا درمانی و به میزان کمتر بصورت خودبخودی یا بدنبال بلع اجسام خارجی یا تروما اتفاق می افتد. یکی از اجسام خارجی که در بالغین باعث پارگی مری می شود استخوان ماهی است.

از علائم شایع سوراخ شدگی مری می توان دیس فازی و اودینوفازی را نام برد اما گاهی احساس جسم خارجی نیز مشاهده می گردد. در کودکان سرفه و استریدور نیز ممکن است دیده شود.

سوراخ شدگی مری ممکن است باعث عوارض بالقوه خطرناکی مثل پنوموتوراکس، پنومومدیاستینوم، امپیم و