

سوءهاضمه، بیماری برگشت محتویات معده به مری و سندرم روده تحریک‌پذیر

در اهداکنندگان خون

دکتر خدیجه حاتمی، دکتر اکرم پورشمیس^{*}، دکتر کوروش عظیمی، دکتر مهدی صرافی

مریم مهربانی، دکتر پریس مستجابی، دکتر محمد رضا اکبری

مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوءهاضمه، بیماری برگشت محتویات معده به مری (GERD)^۱ و سندرم روده تحریک‌پذیر (IBS)^۲ جزو شایعترین بیماریهای دستگاه گوارش می‌باشند. این بیماریها باعث کاهش کیفیت زندگی افراد می‌شوند و بار اقتصادی سنگینی بر دوش جامعه تحمیل می‌کنند. شیوع سوءهاضمه، GERD و IBS در کشورهای غربی به ترتیب ۱۸-۳۰٪، ۲۵-۳۰٪ و ۱۰-۱۵٪ و در کشورهای آسیایی به ترتیب ۸-۱۴٪، ۳-۷٪ و ۳-۵٪ است. شیوع این بیماریها در کشور ما مشخص نیست. هدف این مطالعه تعیین شیوع نشانه‌های بیماریهای فوق در اهداکنندگان خون در تهران بود.

۳۵۱۷ نفر (۳۱۱۵ مرد، ۴۰۲ زن) از اهداکنندگان خون در سال ۱۳۸۰ به طور تصادفی انتخاب و وارد مطالعه شدند. ده پزشک عمومی آموزش‌دیده با شرکت‌کنندگان در مطالعه مصاحبه نمودند و پرسشنامه‌ای را که براساس وجود نشانه‌های اصلی ریفلакс (سوژش سردل و با رگورژیتاسیون)، سوءهاضمه و نیز وجود معیارهای Rome I IBS در طی یک سال گذشته تنظیم شده بود کامل کردند.

فراوانی نسبی سوءهاضمه مشابه زخم ۷/۳٪ [P<۰/۰۱] و سوءهاضمه مشابه اختلال حرکتی ۲/۸٪ [P<۰/۰۱] مردان (۲۵۹ نفر)، ۳۲٪ [P<۰/۰۱] زنان (۲۲۷ نفر)، ۰/۸٪ [P<۰/۰۱] مردان (۷۵ نفر)، ۰/۵٪ [P<۰/۰۱] زنان (۲۳ نفر) بود. فراوانی نسبی GERD به صورت حداقل یک بار در هفته ۱۱/۳٪ و حداقل یک بار در ماه ۰/۸٪ بود و اختلافی بین گروههای جنسی وجود نداشت. فراوانی نسبی IBS ۰/۵٪ [P<۰/۰۱] مردان (۱۵۲ نفر)، ۱۱/۳٪ [P<۰/۰۱] زنان (۴۵ نفر) بود.

هر سه بیماری فوق در اهداکنندگان خون شایع است. شیوع سوءهاضمه در این جمعیت کمتر از کشورهای غربی و مشابه جوامع آسیایی می‌باشد، در حالی که شیوع IBS و ریفلакс در آنان بیش از کشورهای آسیایی و مشابه کشورهای غربی است. انتظار می‌رود شیوع این بیماریها در جامعه بیشتر از میزان به دست آمده در این مطالعه باشد، زیرا اهداکنندگان خون سالمتر از افراد جامعه هستند. گوارش، ۱۳۸۲؛ سال هشتم: ۴۶-۱۳۸

واژه‌های کلیدی: سوءهاضمه مشابه زخم (Dysmotility-like dyspepsia)، سوءهاضمه مشابه اختلال حرکتی (Ulcer-like dyspepsia)، سندرم روده تحریک‌پذیر (IBS)، بیماری برگشت محتویات معده به مری (GERD)، معیار Rome I، سوژش سردل (Heartburn)، بازگشت آسید معده به حلق (Regurgitation)

1. Gastroesophageal Reflux Disease
2. Irritable Bowel Syndrome

*نویسنده مسئول: دکتر اکرم پورشمیس- تهران، خیابان کارگر شمالی،

بیمارستان دکتر شریعتی، مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد

تلفن و نمایر: ۰۱۲۹۹۳

E-mail: pourshams@ams.ac.ir