

شاخ پوستی و کالوزیته قوزک پا: گزارش یک مورد

دکتر محمدرضا مرتضوی^۱، دکترمانی محمدزاده^۲، دکتر ابوذر حسینی^۲

۱-متخصص پوست، ۲-متخصص آسیب‌شناسی؛ دانشگاه علوم پزشکی مازندران

فشار مداوم یا متناوب روی پوست ایجاد می‌شود و قوزک خارجی پا از نقاط شایع بروز آن است. در اینجا یک مورد نادر شاخ پوستی ایجاد شده روی کالوزیته قوزک پا گزارش می‌شود. **واژه‌های کلیدی:** شاخ پوستی، کالوزیته، قوزک پا

شاخ پوستی یک ضایعه کراتوتیک شاخ مانند است که بروز آن در نواحی سر و صورت شایع می‌باشد و در زمینه ضایعات مختلف خوش‌خیم یا بدخیم پوست به وجود می‌آید. کالوزیته پلاکی هیپرکراتوتیک است که در اثر

معرفی بیمار

روی زمین نشسته و تقریباً همیشه پای چپ را در زیر بدن قرار دهد. ضایعه مذکور همراه با پخشی از پوست زیرین آن، برداشته شده و برای آسیب‌شناسی ارسال گردید. در بررسی میکروسکوپی بخش شاخی ضایعه، لایه‌های متراکم کراتین که بر روی هم قرار گرفته بودند مشاهده شد (تصویر شماره ۲). در قاعده شاخ، پاراکراتوز واضح لایه شاخی ضخیم شده در بالای لایه گرانولر مشخص، مشهود بود (تصویر شماره ۳). اپیدرم به جز پایلو ماتوز مختصر، تغییر مهمی نداشت و اثری از تغییرات یافت‌شناسی بدخیم یا خوش‌خیم دیگر در درم دیده نشد.

بیمار زنی ۶۰ ساله، خانه‌دار، ساکن یکی از روستاهای شهرستان بهشهر در استان مازندران بود که با شکایت خارش و ترک کف پاها مراجعه نمود. در معاینه علاوه بر هیپرکراتوز کف پاها، ضایعات کراتوتیک برجسته در ناحیه قوزک‌های خارجی پا مشاهده شد که طی چندین سال بوجود آمده بود. ضایعه قوزک پای چپ بیمار (که بزرگتر بود)، یک کالوزیته شاخ مانند به طول ۳۰ تا ۳۵ میلی‌متر بود که پایه آن در اثر ضربه‌های مکرر در برخی نقاط از پوست زیرین جدا شده بود (تصویر شماره ۱). بیمار عادت داشت که برای انجام کارهای روزمره خانه به صورت چهارزانو بر



تصویر شماره ۱ - ضایعه کراتوتیک شاخ مانند قوزک پای چپ بیمار

مؤلف مسئول: دکتر محمدرضا مرتضوی - مازندران، بهشهر، خیابان امام خمینی، بیمارستان امام خمینی، بخش پوست