



## بررسی اثر مشاوره گروهی بر آگاهی و نگرش نسبت به HIV/AIDS در زنان HIV مثبت مراجعه کننده به درمانگاه شهدا شهر همدان

اکرم محمدی قیصر<sup>۱</sup>، بتول خداکرمی<sup>۲\*</sup>، قدرت الله روشنائی<sup>۳</sup>، پریسا پارسا<sup>۴</sup>، فاطمه شبیری<sup>۵</sup>

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

[nedamohammadi85@gmail.com](mailto:nedamohammadi85@gmail.com)

۲- مربی عضو هیأت علمی گروه مامایی و مرکز مراقبتهای مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران نویسنده مسئول

[Zahrabatul2006@yahoo.com](mailto:Zahrabatul2006@yahoo.com)

۳- PhD آمارزیستی عضو هیأت علمی گروه آمارزیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

[gh.roshanaei@umsha.ac.ir](mailto:gh.roshanaei@umsha.ac.ir)

۴- PhD بهداشت باروری عضو هیأت علمی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

[pparsa2003@yahoo.com](mailto:pparsa2003@yahoo.com)

۵- PhD بهداشت باروری عضو هیأت علمی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

[fshobeiri@yahoo.com](mailto:fshobeiri@yahoo.com)

### چکیده

**زمینه و هدف:** به طور کلی، زنان و دختران دو تا چهار برابر مردان مستعد ابتلا به اچ آی وی / ایدز بوده و بیش از نیمی از تمامی موارد جدید عفونت در دنیا در جمعیت زنان رخ می دهد لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر مشاوره گروهی بر آگاهی و نگرش نسبت به HIV/AIDS در زنان HIV مثبت مراجعه کننده به درمانگاه شهداء شهر همدان انجام شده است.

**روش کار:** این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی انجام شده است. جمعیت مورد مطالعه، زنان مبتلا به HIV مثبت، تحت پوشش کلینیک مثلثی درمانگاه شهدای شهر همدان می باشند. افراد بطور تصادفی در دو گروه آزمون (۳۰ نفر) و کنترل (۳۰ نفر) قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک فردی و اجتماعی، پرسشنامه آگاهی و نگرش بود که در هر دو گروه از طریق مصاحبه تکمیل شد. گروه آزمون، در ۴ جلسه کلاس مشاوره هفتگی که بصورت گروههای ۵ تا ۷ نفره بود، شرکت کردند ولی گروه کنترل فقط مراقبت های روتین را دریافت کردند. قبل و پس از انجام مشاوره، پرسشنامه ها بین دو گروه توزیع شده و توسط افراد تکمیل گردید. در پایان اطلاعات حاصل از طریق نرم افزار SPSS نسخه ۲۱ و آزمون های کوواریانس (ANCONA) تی مستقل (T-test) و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سطح معنا داری آزمونها کمتر از ۵ درصد در نظر گرفته شد

**یافته ها:** نتایج نشان داد سن، مدت زمان ابتلا، شغل و تحصیلات دارای توزیع غیرنرمال می باشد. میانگین سنی افراد برابر ۳۰

سال، مدت زمان ابتلا ۵ سال و میزان تحصیلات اکثر افراد کمتر از دیپلم بود میانگین امتیاز آگاهی از بیماری ایدز در گروه آزمون