

بررسی سن شروع تغذیه تكمیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در شیرخواران شهر سمنان

اکرم شهبازی^۱(M.D) ، راهب قربانی^{۱*}(Ph.D) ، فرشید فریور^۲(M.D) ، علیرضا شاه حسینی^{۳a}(M.D)

۱- دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشکده پزشکی، گروه پزشکی اجتماعی

۲- دانشگاه علوم پزشکی سمنان، مرکز بهداشت شهرستان سمنان

چکیده

سابقه و هدف: بقا، سلامت و رشد کودکان ارتباط مستقیم با تغذیه آنان دارد و سوء تغذیه کودکان، مشکل شایع بیشتر کشورهای در حال توسعه می باشد. سن شروع تغذیه تكمیلی در شیرخواران موقعی است که شیرخوار نمی تواند مقادیر کافی انرژی و مواد غذایی را از شیر مادر به تنها ی کسب کند. شروع زودرس و دیررس غذای تكمیلی هر دو باعث ایجاد عوارض شدید می شود و سن مناسب این کار از پایان ۶ ماهگی است. با توجه به اهمیت زمان شروع تغذیه تكمیلی، این تحقیق در سمنان به منظور برآورد سن شروع تغذیه تكمیلی و عوامل مرتبط با آن انجام شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی بر روی ۱۲۰ نفر از کودکان ۶-۱۲ ماهه شهر سمنان انجام گردید. در هر یک از هشت مرکز بهداشتی درمانی شهر سمنان ۵ مادری که جهت پایش فرزند خود مراجعه کرده بودند، انتخاب و پرسش نامه توسط پرسنل بهداشتی با مصاحبه از مادران شیرده (یا توسط مادر) تکمیل گردید.

یافته‌ها: ۷۶/۳ درصد مادران تغذیه تكمیلی شیرخواران را از ۶ ماهگی آغاز کردند. شایع‌ترین غذای کمکی مورد استفاده (۵/۶۹ درصد) در اولین تغذیه فرنی بود. میانگین (\pm انحراف معیار) سن شروع تغذیه تكمیلی ۶/۶ ± ۰/۵ ماهگی بود. ۵/۹۷ درصد مادران آموزش لازم برای تغذیه شیرخواران خود را از طریق حضوری، جزو و کتاب، کارت واکسن و پمپلت قبل از ۶ ماهگی شیرخوار فرا گرفته بودند. بین سن شروع تغذیه تكمیلی با اشتغال مادران (۴۹/۰ = P)، سن مادر (۴۰/۰ = P)، سطح سواد پدر (۲۰/۰ = P) و نوع زایمان (۱۵/۰ = P) ارتباط معنی‌داری وجود داشت. اما بین جنس کودک، نوع شیر مصرفی، رتبه تولد، مرکز مراقبت از شیرخوار، سطح سواد مادر، اولین غذای کمکی شیرخوار و روش آموزش مادران با سن شروع تغذیه تكمیلی ارتباط معنی‌داری دیده نشد.

نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان می دهد که اگرچه ۵/۷۶ درصد مادران آموزش لازم برای شروع تغذیه تكمیلی را دیده‌اند ولی حدود ۲۳ درصد آنها در موعد مقرر تغذیه تكمیلی را آغاز نکرده‌اند. لذا ضروری است دامنه آموزش وسیع تر شود و آموزش موثرتری توسط مراکز بهداشتی درمانی به مادران (بالاخص مادران با زایمان طبیعی و سنین بالا) داده شود.

واژه‌های کلیدی: تغذیه تكمیلی، شیرخوار، سن شروع تغذیه

مقدمه

تغذیه آنان دارد و سوء تغذیه کودکان مشکل شایع بیشتر کشورهای در حال توسعه است [۱]. همان طور که کودک رشد

بقاء، سلامت، رشد و تکامل کودکان ارتباط مستقیم با