

پوزش:

ضمن پوزش از استاد گرامی، جناب آقای دکتر گل محمدی و همکارانشان و خوانندگان عزیز مجله درباره اشتباهات چاپ مقاله ایشان تحت عنوان "بررسی ید ادرار ۲۴ ساعته در مبتلایان به گواتر" که در مجله "سال دوم - شماره پنجم و ششم - زمستان ۷۲ و بهار ۷۳" به چاپ رسید پس از تصحیح مجدداً مقاله ایشان در این شماره چاپ شده است.

بررسی ید ادرار ۲۴ ساعته در مبتلایان به گواتر

دکتر تقی گل محمدی - دکتر منوچهر نخجوانی - دکتر ناصر ملک‌نیا و هاجر سلطانی

خلاصه:

طی یک بررسی سلکتیو (Selective) روی بیماران مبتلا به گواترهای مولتی‌ندولر و ساده در سال ۶۷-۱۳۶۶ در مجتمع بیمارستانی ولی عصر وابسته به بیمارستان امام خمینی تهران معین شد که میزان ید ادرار ۲۴ ساعته آنان بین ۹۹-۶ میکروگرم و بطور متوسط ۴۸/۴ بود. حداکثر شیوع بیماری در سنین ۳۰-۱۵ سالگی و حداکثر شیوع جنسی آن در زنان بویژه در دوران بلوغ و جوانی مشاهده شد. (۸۲/).

با توجه به قرار گرفتن ایران در کمربند جهانی کمبود ید و پائین بودن میزان ید ادرار ۲۴ ساعته بیماران و شیوع بیماری گواتر در جوانان لزوم پیشگیری بروز بیماری با دست یازیدن به روش‌های مختلف و تشخیص و درمان زودرس بیماران مبتلا به منظور کاهش عوارض اجتماعی، اقتصادی و درمانی آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.