

مقایسه زمان بستری و هزینه بیماران مبتلا به هیپرپلازی خوش خیم پروستات (BPH) در دو روش جراحی باز و رزکسیون پروستات از طریق پیشابراه (TUR) در مرکز آموزشی درمانی شفیعیه زنجان، ۱۳۷۸

دکتر ناصر مرادی *

خلاصه:

تعداد ۱۱۶ مورد پروستاتکتومی در طی ۶ ماه اول سال ۷۸ در مرکز آموزشی - درمانی شفیعیه زنجان انجام شد. از این تعداد ۹۸ مورد (۸۴/۵٪) به روش TUR و ۱۸ مورد (۱۵/۵٪) عمل باز بود. میانگین اشغال تخت در TUR نسبت به میانگین زمان بستری در عمل باز ۶۳٪ و در خصوص هزینه بیماران ۶۸/۸٪ بود. با توجه به عوارض کمتر، راحتی بیشتر، زمان بستری کوتاهتر و هزینه درمان کمتر در TUR پروستات، این روش نسبت به عمل باز توصیه و فراگیری هر چه کاملتر آن به دستیاران ارولوژی مورد تأکید قرار گرفته است.

واژه‌های کلیدی: ایران، زنجان، دانشگاه علوم پزشکی، هزینه، پروستات، جراحی باز، TUR

مقدمه:

بیماران می‌باشد. با تکامل دستگاههای TUR در حال حاضر حدود ۹۰٪ از پروستاتکتومی‌ها به این روش انجام می‌گیرد (۲). که از نظر زمان بستری در بیمارستان، هزینه‌های درمانی و نیز سهولت درمان (در موارد قابل اجرا)، نسبت به پروستاتکتومی باز بسیار با صرفه‌تر و از نظر بیماران مقبول‌تر می‌باشد. بنا به گزارش دکتر انصاری از بیمارستان ویکتوریا استرالیا طول مدت بستری بیماران TUR شده در سال ۱۹۸۷ ۱۰/۶ روز بوده که در سال ۱۹۹۵ به ۶/۱ روز کاهش یافته است (۳). ضمناً عوارض زمان بستری در پروستاتکتومی‌های

عظیم خوش خیم پرستات ناشی از هیپرپلازی سلولهای غده‌ای (BPH) در بین تومورهای خوش خیم مردان از نظر شیوع مقام اول را دارد و علائم ناشی از آن در ۵۰ درصد آقایان از ۵۰ سالگی بروز می‌کند و در حدود ۲۵٪ از مردان نیاز به عمل جراحی پروستاتکتومی قطعیت می‌یابد (۱). در کنار روش‌های کانسرواتیو و طبی و تیمه تهاجمی (استفاده از لیزر، هیپرترمی، stent و ...) عمل جراحی پروستاتکتومی به صورت باز و جراحی TUR اصلی‌ترین اقدام درمانی این