

یورتروسل در سیستم دوگانه ادراری در دختر بچه سه ساله، عفونتهای مکرر ادراری

دکتر ناصر مرادی *

خلاصه:

کودک سه ساله‌ای با عفونتهای مکرر ادراری مورد بررسی قرار گرفت که نهایتاً به تشخیص عیب مادر زادی سیستم دوگانه ادراری، یورتروسل، ریفلاکس ادراری بعنوان علل عفونتهای ادراری کودک شناخته شد. (۵) و سپس به علاج علتی بیماری انجامید. در این بحث بر اهمیت بررسی عفونتهای ادراری در کودکان تاکید شده است.

واژه‌های کلیدی: ایران، زنجان، دانشگاه علوم پزشکی، یورتروسل، سیستم دوگانه ادراری، ریفلاکس ادراری،

سیستوسکوپی.

مقدمه:

یورتروسل تا زیر مخاط پیشابراه می باشد واصطلاحاً *cecoureterocele* نامیده شده است. (۱) شیوع یورتروسل را از یک در پانصد تا یک در دوازده هزار ذکر کرده‌اند. در دخترها سه یا چهار برابر پسرها است وبیشتر در طرف چپ می باشد و حدود ۱۵-۱۰ درصد موارد دو طرفه است. در بچه‌ها یورتروسل‌های اکتوپیک (سوراخ در گردن مثانه و یا پیشابراه) شایعتر بوده وبیشتر درحالب های دوگانه دیده می شود. (۱)

معرفی بیمار:

دختر بچه سه ساله ای با شکایت از دردهای متناوب شکمی و گهگاه عفونت ادراری (ثابت شده در آزمایشات ادراری) ، به مطب آورده شد . در معاینه بالینی علائم واضح مرضی نداشت . در سونوگرافی

گشاد شدن کیسه‌ای حالب زیرمخاطی درون مثانه را یورتروسل می‌گویند. (۱) و به اندازه‌های مختلف دیده می‌شود. یورتروسل ممکن است مربوط به حالب منفرد و یا دوگانه باشد که در حالت اخیر به حالب پل فوقانی کلیه مربوط است. حالب مربوط به یورتروسل معمولاً گشادتر از حالت طبیعی بوده و حالب مربوط به پل نحتانی کلیه نیز خیلی وقتها ریفلاکس (بازگشت ادرار از مثانه به دستگاه ادراری فوقانی) دارد یورتروسل‌ها بنا به دسته‌بندی *stephen* (۱۹۶۳) به سه دسته ؛ *stenotic* (سوراخ حالبی تنگ) ، *sphincteric* (سوراخ در گردن مثانه و یا پیشابراه پروگسیمال) و *sphinctero - stenotic* (مجموع دو حالت قبلی) تقسیم بندی میشوند . نوع چهارمی نیز گزارش شده که سوراخ در درون مثانه ولی ادامه