

گزارش مورد

ملانوم ولو در سن قبل از منوپوز (گزارش مورد)

دکتر سیما کدخدایان*^۱، دکتر فاطمه همایی^۲، دکتر سیدحسین فتاحی معصوم^۳، دکتر لیلا پور علی^۴، دکتر علی تقی زاده^۲
۱- دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. ۲- استادیار گروه رادیوتراپی انکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
۳- استاد گروه جراحی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. ۴- دستیار تخصصی زنان و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

چکیده

ملانوم ولو تومور بسیار بدخیم و نادری با شیوع ۰/۱۹-۰/۱ در صدهزار نفر بوده و اغلب بعد از منوپوز اتفاق می افتد. در این مقاله بیماری ۴۳ ساله معرفی شده است که با شکایت پیدایش ضایعه کوچک خارش دار از ۲ ماه قبل در ناحیه ولو مراجعه نمود. ضایعه مذکور به قطر ۵ میلی متر قهوه ای تیره در روی لابیالیس مینور چپ به فاصله بیش از ۲ سانتی متر از خط وسط وجود داشت. بیوپسی ملانوم بدخیم با عمق ۳/۵ میلی متر طبق تقسیم بندی *berslow* نوع حد وسط گزارش گردید. حذف جراحی با حاشیه بیش از ۲ سانتی متر و لنفادنکتومی اینگونیا و فمورال در طرف ضایعه انجام شد و تا ۴ ماه بعد از عمل جراحی علائمی از عود تومور دیده نشد.

کلید واژه ها: تومور ولو، ملانوم، لنفادنکتومی

* نویسنده مسؤول: دکتر سیما کدخدایان، پست الکترونیکی: kadkhodayans@mums.ac.ir

نشانی: مشهد، بیمارستان قائم (عج)، دفتر گروه زنان، تلفن: ۸۰۱۲۴۷۷ (۰۵۱۱)، نمابر: ۴۳۰۵۶۹

وصول مقاله: ۸۷/۱۰/۲۵، اصلاح نهایی: ۸۸/۴/۱۰، پذیرش مقاله: ۸۸/۴/۲۱