

تحقیقی

فراوانی اختلال وسواسی - اجباری در بیماران اسکیزوفرنیک بستری براساس مصاحبه بالینی ساختاریافته مبتنی بر DSM-IV (SCID)

چکیده

زمینه و هدف: شیوع مادام‌العمر اسکیزوفرنی در ایالات متحده ۱ تا ۱/۵ درصد برآورد شده است و مطالعات مختلف نشان داده که بین ۷/۸ تا ۴۶/۶ درصد این افراد دچار علائم وسواسی اجباری هستند. تفاوت در این آمار تا حدی به روش‌های ارزیابی و درمان‌های انجام شده بستگی دارد. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی این اختلال در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بستری انجام شد.

روش بررسی: در یک مطالعه مقطعی ۹۶ بیمار (۵۶ مرد و ۴۰ زن) دچار اسکیزوفرنی (براساس معیار تشخیصی DSM-IV) که در بیمارستان روانپزشکی ایران بستری بودند، براساس نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به وسیله مصاحبه بالینی استاندارد (SCID) از لحاظ ابتلا به اختلال وسواسی اجباری بررسی شدند.

یافته‌ها: دامنه سنی این بیماران ۱۷ تا ۷۳ سال و میانگین سنی آنان 35.1 ± 12.6 بود. اکثریت بیماران (۸۸/۵ درصد) مبتلا به نوع پارانوئید اسکیزوفرنی بودند. براساس مصاحبه بالینی ۴۷ نفر (۴۹ درصد) دچار علائم وسواسی - اجباری بودند. متوسط سن شروع اسکیزوفرنی در کل بیماران 24.7 ± 8.8 و متوسط سن شروع وسواس در افراد مبتلا 20.2 ± 6.7 بود. در ۱۷ درصد افراد دو اختلال هم‌زمان ایجاد شده بود و در ۲۰/۸ درصد اسکیزوفرنی زودتر ظاهر یافته بود. نتیجه‌گیری: در مطالعه ما، نزدیک به نیمی از بیماران اسکیزوفرنیک بررسی شده دچار اختلال وسواسی - اجباری نیز بودند که همراهی قابل توجهی را نشان می‌دهد. با این حال براساس مطالعه حاضر نمی‌توان روابط علیتی را بین دو اختلال مشخص نمود.

کلید واژه‌ها: اختلال وسواسی - اجباری - اسکیزوفرنی - مصاحبه بالینی

دکتر مریم پاکروان
روانپزشک

دکتر میرفرهاد قلعه‌بندی
روانپزشک و استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر کاوه علوی
پزشک عمومی

عزیزه افخم ابراهیمی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
عضو علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

نویسنده مسؤول: دکتر مریم پاکروان
پست الکترونیکی: mpakravana@yahoo.com

نشانی: تهران، کیلومتر ۶ جاده مخصوص کرج
مرکز روانپزشکی ایران
تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۰۳۳۹۵-۹
نمابر: ۷۷۶۵۴۸۶۸

وصول مقاله: ۸۵/۵/۲
اصلاح نهایی: ۸۵/۱۱/۳
پذیرش مقاله: ۸۶/۱/۲۸