

گزارش مورد

گزارش یک مورد توده کورتکس غده فوق کلیوی در دختر ۲۰ ماهه

دکتر محمدرضا دارابی محبوب*^۱، دکتر علیرضا دلجانی^۲

۱- دانشیار گروه جراحی کلیه و مجاری ادراری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. ۲- دستیار تخصصی گروه جراحی کلیه و مجاری ادراری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

چکیده

تومورهای تولید کننده صفات ثانویه جنسی (ویریلیزان) کورتکس غده فوق کلیوی در اطفال نادر می باشد. شیوع سرطان آدرنال حدود ۱ درصد است. در مقایسه با بیماران بزرگسال در اطفال توده قشر غده فوق کلیوی دارای علامت می باشد. بیمار یک کودک ۲۰ ماهه بود که با علائم بالینی ویریلیزاسیون به صورت افزایش توده استخوانی، رشد موهای ناحیه تناسلی و زیر بغل و رشد اندام تناسلی خارجی مراجعه کرده بود. در بررسی آزمایشگاهی سطح تستوسترون 400 ng/dl ، آندروستندیون $3/6 \text{ ng/dl}$ ، پروژسترون $19/9 \text{ ng/dl}$ و سطح بالای از دی هیدرواپی آندروسترون 8000 ng/dl وجود داشت. در سی تی اسکن توده آدرنال راست به اندازه بیش از حدود ۵ سانتی متر گزارش شد. بیمار تحت عمل جراحی باز غده فوق کلیوی از طریق برش پهلو قرار گرفت و پس از آن به مدت ۱۰ سال پیگیری شد و هیچ گونه عارضه‌ای دیده نشد.

کلید واژه‌ها: تومور ترشح کننده صفات ثانویه جنسی غده فوق کلیوی، غده فوق کلیوی

* نویسنده مسئول: دکتر محمدرضا دارابی، پست الکترونیکی: j_darabi@yahoo.com

نشانی: مشهد، بیمارستان امام رضا (ع)، بخش اورولوژی، کدپستی ۹۱۳۷۹۱۳۳۱۶، تلفن: ۰۵۱۱-۸۰۲۲۵۵۳، نمابر: ۸۵۹۱۰۵۷
وصول مقاله: ۸۶/۸/۱، اصلاح نهایی: ۸۷/۶/۲۳، پذیرش مقاله: ۸۷/۷/۶