

گزارش کوتاه

همراهی عفونت هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به تب تیفوئید

دکترسید محمد علوی*^۱، دکتر آرش اعتمادی^۲، دکتر مهرداد عزمی^۳

۱- متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشیار دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری جندی شاپور اهواز. ۲- متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری، بیمارستان گلستان اهواز. ۳- متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری‌های گوارشی، استادیار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز.

چکیده

زمینه و هدف: گزارشات متعددی در مورد ارتباط یا همراهی تب تیفوئید و عفونت هلیکوباکترپیلوری در مناطق مختلف دنیا وجود دارد. این مطالعه به منظور بررسی همراهی عفونت هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به تب تیفوئید در شهر اهواز انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه مورد شاهدی ۵۰ بیمار بستری با تشخیص قطعی تیفوئید در بیمارستان‌های رازی و ابوذر شهر اهواز مورد مطالعه قرار گرفتند. به ازاء هر بیمار یک نفر شاهد با تطابق سنی و جنسی با شرایط اقتصادی اجتماعی یکسان انتخاب شد. از تمام افراد آزمایش سرولوژی (IgG) هلیکوباکترپیلوری به روش ELISA انجام شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون آماری کای اسکوئر و تست دقیق فیشر تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: فراوانی سرمی هلیکوباکترپیلوری در گروه مورد (۶۶ درصد) از گروه شاهد (۴۴ درصد) بیشتر بود ($P < 0/05$). در مردان اختلاف معنی‌دار آماری بین گروه مورد و شاهد از نظر عفونت هلیکوباکترپیلوری مشاهده شد ($P < 0/05$).

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که همراهی معنی‌داری در جنس مذکر بین تب تیفوئید و عفونت هلیکوباکترپیلوری وجود دارد.

کلید واژه‌ها: هلیکوباکترپیلوری، آزمایش سرولوژی، تب تیفوئید، اهواز

* نویسنده مسئول: دکتر سیدمحمد علوی، پست الکترونیکی: alavi1329dr@yahoo.com

نشانی: اهواز، خیابان فلسطین، بیمارستان رازی، تلفن: ۳۳۸۷۷۲۴ (۰۶۱۱)، نمابر: ۳۳۳۳۰۵۰

وصول مقاله: ۸۷/۲/۱۷، اصلاح نهایی: ۸۷/۸/۲۵، پذیرش مقاله: ۸۷/۸/۲۹