

گزارش یک مورد ورم عصب بینایی دوطرفه پس از واکسیناسیون سرخک و سرخجه

دکتر محمدرضا محمدی*^۱، دکتر بهناز خدابخشی^۲، دکتر محمدمهدی مطهری^۳، دکتر حمید عبادی^۴

چکیده

بیمار دختر ۱۳ ساله‌ای است که دو هفته بعد از تزریق واکسن سرخک - سرخجه دچار کاهش شدید بینایی دوطرفه شد و به منظور بررسی در مرکز آموزشی - درمانی پنجم آذر گرگان بستری گردید. سابقه بیماری قبلی وجود نداشت و در خانواده نیز سابقه بیماری خاصی گزارش نشده بود. واکسیناسیون وی طبق برنامه کشوری واکسیناسیون انجام شده بود. معاینه اولیه کاهش شدید دید چشم راست در حد درک نور و در چشم چپ به میزان فقط تشخیص حرکات دست وجود داشت. معاینه ته چشم التهاب دوطرفه سرعصب اپتیک را نشان می‌داد. ویزیونگ دوطرفه ربوی نیز در سمع ریه به گوش می‌رسید. سی تی اسکن مغز و MRI طبیعی بود. عکس سینه و اسمیر و کشت خلط هم نکته پاتولوژیکی نداشت. با پالس تراپی با متیل پردنیزولون بینایی چشم راست به حد ۲ متر شمارش انگشتان و دید چشم چپ به ۶/۱۰ رسید و با پیگیری سه ماه بعد از درمان هم دید هر دو چشم در همین حد باقی مانده بود. علت گزارش این بیمار نادر بودن عوارض عصبی به ویژه نوریت اپتیک دوطرفه به دنبال تزریق واکسن سرخجه و سرخک می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: ورم عصب بینایی، واکسیناسیون سرخک و سرخجه

*۱ - متخصص جراحی مغز و اعصاب و استادیار دانشگاه علوم پزشکی گرگان

نشانی: گرگان، مرکز آموزشی درمانی ۵ آذر، بخش جراحی اعصاب

تلفن: ۴-۴۴۲۰۵۶۱-۰۱۷۱، پست الکترونیک: mr_mohammadi_md@yahoo.com

۲ - متخصص بیماری‌های عفونی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی گرگان

۳ - متخصص چشم پزشکی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی گرگان

۴ - متخصص نورولوژی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی گرگان