

گزارش یک مورد بازسازی لب تحتانی با استفاده از فلپ زبانی

دکتر امین راه پیمان*، دکتر مجید عشق پور**#

* استادیار گروه جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

** دستیار تخصصی گروه جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاریخ ارائه مقاله: ۸۷/۱۱/۵ - تاریخ پذیرش: ۸۸/۲/۱۹

Lower Lip Reconstruction with Tongue Flap: A Case Report

Amin Rahpeima*, Majid Eshghpour**#

* Assistant Professor, Dept of Oral & Maxillofacial Surgery, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

** Postgraduate Student, Dept of Oral & Maxillofacial Surgery, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

Received: 25 Jan 2009; Accepted: 9 May 2009

Introduction: Lower lip is one of the most important structures in face aesthetics and function of oral cavity. This vital component is endangered due to trauma destruction caused by malignant lesions and therefore, it is important to restore function and beauty of this important part. The purpose of this study was to present the method of lower lip reconstruction with tongue flap.

Results: A 40 years old woman with large lower lip destruction as a result of car accident was brought to Shahid Kamyab hospital, and reconstruction was done in three phases with the use of a tongue flap.

Conclusion: It is important to be familiar with local flaps, especially tongue flap which has a good blood supply. Using tongue as a donor, it is expected to gain a high rate of success.

Key words: Reconstruction, lower lip, tongue flap.

Corresponding Author: Eshghpourm831@mums.ac.ir

J Mash Dent Sch 2009; 33(3): 255-8.

چکیده

مقدمه: لب پائین جزء ساختارهای بسیار مهم در زیبایی صورت و فانکشن حفره دهان می باشد. این جزء حیاتی در معرض صدمات تروماتیک و یا تخریب در اثر ضایعات بدخیم می باشد که بازگرداندن فانکشن و زیبایی این جزء مهم بسیار حیاتی می باشد. هدف از این مطالعه، معرفی روش بازسازی لب پائین با استفاده از فلپ زبانی بود.

یافته ها: خانم ۴۰ ساله در اثر سانحه رانندگی دچار تخریب بخش عظیمی از لب پائین شده بود که به بیمارستان شهید کامیاب مراجعه نمود و در سه مرحله جراحی بازسازی لب پائین با استفاده از فلپ زبانی صورت پذیرفت.

نتیجه گیری: آشنایی با فلپ های موضعی خصوصاً فلپ زبانی که بعلت خونرسانی فوق العاده برای بازسازی نواحی آسیب دیده مناسب است، بسیار مهم می باشد. با استفاده از زبان بعنوان محل دهنده پیوند موفقیت بالایی را در بازسازی ها می توان بدست آورد.

واژه های کلیدی: بازسازی، لب پائین، فلپ زبانی.

مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد / سال ۱۳۸۸ / دوره ۳۳ / شماره ۳: ۲۵۵-۸.

مقدمه

تنوعات مختلف این فلپ، نواحی مورد استفاده برای بازسازی نیز دچار پیشرفت گردید^(۳) و به تدریج توسط جراحان مختلفی برای بازسازی های بزرگ مورد استفاده قرار گرفت.^(۴) تا اینکه در سال ۱۹۶۴ Bakamjian زبان را به عنوان یک منبع فوق العاده برای بازسازی لب به دنبال

فلپ زبانی اولین بار توسط Lexer در سال ۱۹۰۹ برای بازسازی های داخل دهانی مورد استفاده قرار گرفت.^(۱) Schurter و Klopp در سال ۱۹۵۶ برای درمان شکاف های کام از این فلپ استفاده نمودند.^(۲) همراه با گسترش