

بررسی فراوانی اختلالات روانپزشکی در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی مراجعه کننده به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد

دکتر زهره دلیرسانی*، دکتر زهرا دلاوریان**،# دکتر عباس جوادزاده***، دکتر حمید طوفانی اصل****، دکتر فرناز فلکی****

* استادیار گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

** استادیار گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

*** دانشیار گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

**** استادیار گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاریخ ارائه مقاله: ۸۶/۲/۱۵ - تاریخ پذیرش: ۸۶/۹/۱۶

Title: Frequency of Psychiatric Disorders in Patients with Oral Lichen Planus Referred to Oral Medicine Department of Mashhad Dental School

Authors: Dalirsani Z*, Delavariyan Z**#, Javadzadeh A***, ToofanyAsl H****, Falaki F**

* Assistant Professor, Dept of Oral Medicine, Dental School, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

** Assistant Professor, Dept of Oral Medicine, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

*** Associate Professor, Dept of Oral Medicine, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

**** Assistant Professor, Dept. of Psychiatry, Medical School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

Introduction: The purpose of this study was to determine the frequency of psychiatric disorders in patients with oral lichen planus.

Materials & Methods: In this descriptive cross sectional study, all the patients with oral lichen planus referred to Oral Medicine Department of Mashhad dental school (from September to October 2003) were examined by a psychiatrist and according to the criteria set by DSM-IV-IR, the presence and type of psychiatric disorders were evaluated. The data were analysed by chi-square and t-tests.

Results: Among 56 patients examined, 54 (96/43%) subjects were diagnosed with at least one psychiatric disorder. 96.41% of subjects were categorized as anxiety disorders.

Conclusion: In this study, majority of the patients, with oral lichen planus had psychiatric disorders. So psychiatric disorders could have a role in developing oral lichen planus.

Key words: Lichen planus, Oral lesions, Psychiatric disorders.

Corresponding Author: DelavarianZ@mums.ac.ir

Journal of Mashhad Dental School 2008; 31(4): 279-84.

چکیده

مقدمه: هدف از این مطالعه بررسی فراوانی انواع اختلالات روانی در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی بود.

مواد و روش ها: در این تحقیق توصیفی-مقطعی، بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی مراجعه کننده به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد (مهرماه ۸۲ تا آذر ماه ۸۳) توسط یک نفر متخصص بیماریهای اعصاب و روان معاینه و وجود یا عدم وجود اختلال روانی و نوع این اختلال روانی بوسیله DSM-IV-IR مورد بررسی قرار گرفت. سپس اطلاعات توسط آنالیز توصیفی و آزمون کای دو و T test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: از میان ۵۶ بیمار مبتلا به لیکن پلان دهانی که وارد این مطالعه شدند، ۵۴ بیمار (۹۶/۴۳ درصد) مبتلا به حداقل یک اختلال روانی بودند. ۹۶/۴۱ درصد از بیماران مبتلا به اختلالاتی بودند که در دسته اختلالات اضطرابی طبقه بندی می شوند.

نتیجه گیری: در این تحقیق اکثریت بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی دچار اختلالات روانی بودند. از این رو شاید بتوان نقشی را برای اختلالات روانی در بروز لیکن پلان قائل بود.

واژه های کلیدی: لیکن پلان، ضایعات دهانی، اختلالات روانپزشکی.

مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد / سال ۱۳۸۶ / جلد ۳۱ / شماره ۴: ۲۷۹-۸۴.