

بررسی فراوانی علائم مثبت و منفی در بیماران مزمن اسکیزوفرنی زن

بیماری اسکیزوفرنی، با آن که به عنوان یک بیماری واحد تحت بررسی قرار می‌گیرد ولی شامل یک سری اختلالاتی است که در یک گروه نامتجانس می‌باشند. بیماران به تیپ ۱ و ۲ تقسیم می‌شوند. بیماران تیپ ۱ علائم مثبت و ۲ علائم منفی بارزی را دارا هستند. گروه مورد بررسی همگی با تشخیص اسکیزوفرنی مزمن سال‌ها تحت درمان با حداقل یک نوع داروی ضد سایکوز بوده‌اند. با استفاده از چک لیست، علائم منفی و مثبت ارزیابی گردید.

در بیماران مزمن توهمات (از علائم مثبت) در کنار اکثر علائم منفی دیده می‌شود. به بیان دیگر، علائم منفی بیمار را بیش‌تر تخریب نموده و کارآیی وی را مختل می‌سازد. در بین علائم منفی، کندی یا سطحی شدن عاطفه - فقدان انگیزش بی‌توجهی اجتماعی و عدم توانایی در صمیمی شدن، بیش‌تر از بقیه یافت می‌گردد. بیمارانی که به داروهای ضد سایکوز کثونی جواب مناسب را نداده‌اند باید مورد بررسی بیش‌تر قرار گرفته و در درمان زن‌ها از داروهای جدیدتری استفاده نمود.

دکتر ساحل همتی

استادیار گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

واژگان کلیدی: تیپ ۱ و ۲ / اسکیزوفرن / علائم منفی / علائم مثبت