

مقایسه فراوانی علایم ظریف عصبی در اختلالات روان‌پزشکی

وجود علایم ظریف عصبی^(۱) در اختلالات روانی همواره مدنظر صاحب‌نظران بوده است. هدف از این پژوهش آن بود که با توجه به کاربردی بودن این علایم در موقعی که شک تشخیصی وجود دارد، یک بار دیگر این رابطه با توجه به اطلاعات جدید در بیماران مختلف روان‌پزشکی در بیمارستان شهید بهشتی کرمان مورد بررسی قرار بگیرد و فراوانی آن در بیماران مختلف با یکدیگر مقایسه شود. بر این اساس، ۲۱۳ بیمار که دارای تشخیص نهایی (اختلال خلقی - اختلال اضطرابی و اسکیزوفرنی) بودند بطور متواالی انتخاب شدند. این حجم نمونه براساس ۹۳٪ اطمینان و نسبت ۳۲٪ و دقت ۶٪ از یک مطالعه مقدماتی به دست آمد. شش آزمایش علائم ظریف عصبی بر روی بیماران انجام گرفت، در نتیجه دیده شد که رابطه‌ی سن با ۴ مورد از تست‌ها، یعنی standing on one foot, Heel walking, Toe walking, Tandem walk معنی دار است و رابطه‌ی اختلالات روانی با دو مورد از تست‌ها معنی دار بود که عبارت بودند از Tongue extrusion (PV=0.01) و Two-Point Discrimination (PV=0.02). افسردگی و دومی در اسکیزوفرنی بالاتر بود و در باقی موارد رابطه‌ی معنی داری وجود نداشت. حاصل این پژوهش نشان دهنده‌ی آن بود که فراوانی اکثر «N.S.S» در اختلالات روانی برابر است و اختلاف اندکی با یکدیگر دارند.

واژگان کلیدی: فراوانی / علایم ظریف عصبی / اختلالات روانی

دکتر سید‌هادی معتمدی
استادیار دانشگاه علوم
بهزیستی و توانبخشی

علی دریجانی
پژوهش عمومی