

# نوروپاتی ناشی از گیرافتادن شاخه داخلی عصب سوراال

دردهای مزمن پشت ساق علل مختلف دارد که شایع‌ترین آنها شکستگی استرس، سیندروم کمپارتمنت مزمن، عضله سولتوس فرعی، و کشیدگی‌های<sup>(۱)</sup> عضلانی می‌باشند. یکی از علل دردهای مزمن ساق، گیرافتادن اعصاب یا نوروپاتی انترپمنت<sup>(۲)</sup> در اعصاب ساق پا است که چون یافته غیر شایعی است در اغلب موارد تشخیص داده نمی‌شود و یا با تأخیر تشخیص داده می‌شوند. بیمار ما آقای ۱۵ ساله‌ای بود که به دلیل درد مزمن ساق مدت‌ها تحت درمان‌های مختلف قرار گرفته، ولی دردی همچنان ادامه داشت. کلیه بررسی‌های پاراکلینیکی و الکترودی‌اگنوستیک نرمال گزارش شده بود. پس از آزاد کردن آپونوروز عصب سوراال با جراحی کلیه علائم بیمار رفع شد. نوروپاتی ناشی از گیرافتادن عصب سوراال در نواحی مختلف از ساق و یا مچ پا و یا پا می‌تواند رخ دهد اما درگیری عصب در ناحیه خلف ساق به عنوان یکی از علل درد مزمن ساق به خصوص در ورزشکاران بیان شده است. مادر بررسی مقالات گزارشی مبنی بر گیرافتادن شاخه داخلی عصب سوراال در محل خروج از فاسیای کرورال در افراد عادی پیدا نکردیم. در این بیماران تشخیص تنها براساس تاریخچه و معاینه بالینی دقیق میسر است و در اغلب موارد تست‌های الکتروود یا کنوستیک نرمال می‌باشد.

دکتر محمود فرزانه

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سید محمد جواد مرتضوی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

واژگان کلیدی: عصب پوستی سوراال داخل‌ی / گیرافتادن اعصاب / دردمزمن خلف ساق