

ختنه زنان در میناب : شیوع ، آگاهی و نگرش

هما احدی* طلعت خدیوزاده*** دکتر قدسیه سیدی علوی*** دکتر حبیب ا. اسماعیلی****

Women's circumcision in Minab : Prevalence, knowledge, attitude

H.Ahadi T.Khadivzadeh Gh.Seyyediaiavi H.Esmaili

Abstract :

Background: Women's circumcision is one of the health problems in some societies. That is excision and removal of different sections of women's genitalia based on cultural aims or non-medical reasons , which are done in four different grades.

Objective: This study was performed to determine the knowledge and attitude of women in fertility age in Minab about women's circumcision in the year 2002.

Methods: In this descriptive-analytic study , 400 women in Minab health centers were selected as samples by non-accidental and objective-oriented sampling. Needed data were gathered by a researcher-made questionnaire to assess knowledge and attitude through a semi-structured interview and also by checklist. Data were analyzed by T-test , chi-square and one-sided variance analysis.

Findings: Prevalence of circumcision were 70% . Between them 87.4% were grade one and 12.6% were grade two. Mean and standard deviation of knowledge number in circumcized group were 2.1 ± 1.6 and in uncircumcized group were 3.05 ± 1.7 . There were no significant difference between two groups ($P < 0.001$). Mean and standard deviation of attitude number in circumcized and uncircumcized groups were 36.5 ± 10.9 and 47.7 ± 9.0 respectively. There were no significant difference between two groups ($P < 0.001$). There were significant positive relationship between knowledge and circumcision grade ($P < 0.001$) and between attitude and circumcision grade ($P < 0.001$).

Conclusion: The knowledge level in majority of samples were weak and their attitude were «No Idea» . Results indicates the necessity for teaching to the people in the region and also it shows the importance of health centers in increasing knowledge and changing the attitudes.

Key words: Women's circumcision, Circumcision grade, Fertility age, Knowledge, Attitude

چکیده :

زمینه : ختنه زنان یکی از مشکلات بهداشتی زنان در برخی از جوامع است . این عمل به معنی بریدن و برداشتن بخش‌های مختلف دستگاه تناسلی زنان بر اساس اهداف فرهنگی یا دلایل غیرطبیعی است که در چهار درجه مختلف انجام می‌شود.

هدف : مطالعه به منظور تعیین شیوع و میزان آگاهی و نگرش زنان سنین باروری شهر میناب در مورد ختنه زنان در سال ۱۳۸۱ انجام شد.

مواد و روش‌ها : در این مطالعه توصیفی تحلیلی ، ۴۰۰ زن ۱۵ تا ۴۹ ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهر میناب به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی و مبتنی بر هدف گزینش شدند. اطلاعات لازم با استفاده از پرسش‌نامه پژوهش‌گر ساخته، سنجش میزان آگاهی و نگرش از طریق مصاحبه نیمه سازمان یافته و همچنین به کمک فهرست مشاهده جمع‌آوری شد . داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تی ، مجذور کای و واریانس یک طرفه تحلیل شد.

یافته‌ها : شیوع ختنه ۷۰ درصد بود که در بین زنان ختنه شده ، ختنه درجه یک ۸۷/۴٪ و ختنه درجه دو ۱۲/۶٪ بود. میانگین نمره آگاهی در گروه ختنه شده در مورد بهداشت باروری $1/6 \pm 2/1$ و گروه ختنه نشده $3/05 \pm 1/7$ از ۱۳ نمره و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود ($P < 0/001$). میانگین نمره نگرش گروه ختنه شده $36/5 \pm 10/9$ و گروه ختنه نشده $47/7 \pm 9/0$ و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود ($P < 0/001$). بین آگاهی و درجه ختنه و بین نگرش و درجه ختنه ارتباط مثبت معنی دار آماری وجود داشت ($P < 0/001$).

نتیجه‌گیری: ضعیف بودن آگاهی و نگرش افراد مورد مطالعه، لزوم آموزش مردم منطقه و اهمیت مراکز بهداشتی - درمانی در افزایش سطح آگاهی و تغییر نگرش‌های مردم را نشان می‌دهد.

کلید واژه‌ها : ختنه زنان ، درجه ختنه ، سن باروری ، آگاهی ، نگرش

* کارشناس ارشد مامایی

** مربی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

*** استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

**** استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد