

همه گیر شناسی صدمات خانگی در شهر کاشان طی سال ۱۳۸۴

*۱ منصور دیانتی ، حسین اکبری
۲

خلاصه

سابقه و هدف: یکی از مسائل تهدیدگر سلامتی در جوامع کنونی، تروماها هستند. در حالی که بسیاری از افراد، محیط خانه را امن تصور می کنند، حدود یک سوم تروماها در منزل اتفاق می افتند. این پژوهش با هدف بررسی همه گیر شناسی حوادث خانگی شهر کاشان در سال ۱۳۸۴ انجام شده است.

مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی بوده که طی آن با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه تلفنی، اطلاعات مورد نظر از ۲۴۰۰ خانواده کاشانی جمع آوری شدند. در پرسشنامه مواردی همچون زمان، محل، علت، نوع صدمه، نحوه درمان و وضعیت حادثه دیدگان قید شده بود. محقق با دسترسی به فهرست شماره تلفن منازل شهر کاشان به طور تصادفی هر ۱۵ روز یک بار با ۱۰۰ شماره تماس گرفته و در صورت وقوع حادثه خانگی، ویژگی های فرد حادثه دیده و حادثه رخ داده در منزل را در فرم مورد نظر درج می نمود.

نتایج: به طور کلی در این مطالعه ۲۴۰۰ خانواده کاشانی در قالب ۱۰۸۰۹ نفر مورد سؤال واقع شدند که از این تعداد، ۲۳۸ نفر تجربه حادثه در منزل را شرح دادند. میزان بروز سالانه حوادث خانگی کاشان ۵۲/۸ درصد بود. از این تعداد، ۸۶ نفر (۳۶/۱ درصد) مرد و بقیه (۶۳/۹ درصد) زن بودند. بیشترین محدوده سنی در بین حادثه دیدگان ۱۱ تا ۲۰ سال با ۶۵ نفر (۲۷/۳ درصد) بود. اکثر حوادث (۳۹/۹ درصد) در صبح و در آشپزخانه (۴۴/۱ درصد) به ویژه در بین زنان (۵۷/۱ درصد) اتفاق افتاده بود. فراوان ترین نوع صدمه در هر دو جنس بریدگی با ۷۶ مورد (۳۱/۹ درصد) و پس از آن سوختگی بود. اکثر حادثه دیدگان در منزل و بدون کمک گرفتن از افراد دیگر (۱۴۲ مورد؛ ۶۰/۱ درصد) درمان شده بودند. مصدومین شکستگی و دررفتگی بیشترین مراجعه به بیمارستان (۹/۵ درصد) را داشتند.

نتیجه گیری: در مجموع نتایج پژوهش نشان داد که شیوع انواع حوادث خانگی در کاشان در مقایسه با سایر پژوهش های انجام گرفته شده در کشور مشابه است.

واژگان کلیدی: همه گیر شناسی، حوادث خانگی، تروما

۱- مربی گروه پرستاری داخلی - جراحی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان- مرکز تحقیقات تروما

۲- مربی گروه بهداشت عمومی و آمار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

* نویسنده مسوول: منصور دیانتی

آدرس: کاشان، کیلومتر ۵ بلوار قطب راوندی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

پست الکترونیک: mandianati@yahoo.com

تلفن: ۰۹۱۳ ۳۶۳ ۳۲۹۱

دورنویس: ۰۳۶۱ ۵۵۵۶۶۳۳

تاریخ دریافت: ۸۷/۷/۲

تاریخ پذیرش نهایی: ۸۷/۱۰/۳

مقدمه

گیرند که حوادث غیرعمد به ویژه سقوط، از معضلات مهم بهداشتی در آمریکا بوده و بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرد [۴]. در ایران طبق آخرین اعلام وزارت بهداشت و درمان میزان حوادث خانگی، ۵۱۲ نفر در هر ۱۰۰ هزار جمعیت، و میزان کشندگی حوادث خانگی ۶ درصد است [۵]. آنالیز هر صدمه و یا حادثه که در منزل اتفاق می افتد با توجه به سن، تغییرات شدیدی را نشان می دهد. حوادث رخ داده در منزل، پدیده های پیچیده ای هستند و با توجه به جمعیت و نوع حادثه، مدیریت آن کاملاً متفاوت است. بدین ترتیب، جهت طراحی مداخلات مناسب پیش گیرانه به

یکی از مسایل تهدیدگر سلامتی در جوامع کنونی تروماها می باشند [۱]. در سال ۲۰۰۰ تروماها باعث مرگ و میر بیش از ۶ میلیون نفر در جهان شده است که حدود ۶۳ درصد از این مرگ ها به علت آسیب های غیرعمدی رخ داده است [۲]. در سال ۲۰۰۷ حدود ۹/۴ میلیون آمریکایی از تعداد کل ۳۴/۳ میلیون نفر مصدوم، به علت صدمه یا مسمومیتی که در منزل اتفاق افتاده بود به مراکز درمانی این کشور مراجعه کرده اند [۳]. Zaloshnja و همکاران در مطالعه ای که در مریلند ایالات متحده انجام داده اند، نتیجه می -