

بررسی اثرات لوامیزول در کودکان مبتلا به سندروم نفروتیک ایدیوپاتیک

دکتر عباس مدنی^۱، دکتر نیلوفر حاجی زاده^۲، دکتر بهار مدنی^۳

چکیده

سابقه و هدف: سندروم نفروتیک نوعی بیماری مزمن کلیوی است که مدت‌هاست از استروئید برای درمان آن استفاده می‌شود. با توجه به عودهای مکرر، عوارض مصرف استروئید، وابستگی به استروئید و نظر به گزارشات متفاوت از اثرات لوامیزول و نیز عدم گزارش از تجربه به کارگیری آن در کشور و به منظور تعیین اثرات لوامیزول، این تحقیق روی کودکان مبتلا به سندروم نفروتیک ایدیوپاتیک مراجعه‌کننده به مرکز طبی کودکان طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۰ انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: تحقیق به روش CASE- SERIES روی ۴۱ کودک مبتلا به سندروم نفروتیک مراجعه‌کننده به مرکز طبی کودکان انجام شد. لوامیزول بر اساس پروتکل استاندارد تجویز شد و تأثیر آن بر دفعات عود بیماری، میزان مصرف استروئید، رمیسیون بیماری و نیز بروز عوارض دارویی آن بررسی شد و مورد قضاوت آماری قرار گرفت.

یافته‌ها: از ۶۳ کودک تحت درمان، ۴۱ بیمار واجد شرایط که $68/3$ درصد پسر و $31/7$ درصد دختر بودند مورد بررسی قرار گرفتند.

متوسط دفعات عود بیماری قبل از شروع لوامیزول $2/48$ عود در سال برای هر بیمار بود که یک سال پس از شروع لوامیزول به $0/78$ عود در سال کاهش یافت ($P=0.008$). ۱۹ نفر از بیماران پس از قطع مصرف لوامیزول در رمیسیون به سر برداشتند. هیچ عارضه جانبی ناشی از مصرف لوامیزول در بیماران مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: لوامیزول تأثیر مثبت روی سندروم نفروتیک دارد و دارویی بی خطری است. لذا به کارگیری دارو و تحت نظر قرار دادن بیماران توصیه می‌شود.

وازگان کلیدی: لوامیزول، سندروم نفروتیک، سندروم نفروتیک وابسته به استروئید، سندروم نفروتیک عودکننده

۱ - گروه نفرولوژی کودکان، بیمارستان مرکز طبی کودکان

۲ - گروه نفرولوژی کودکان، بیمارستان امام خمینی(ره)

۳ - پژوهش عمومی