

# پری کورونیت

Pericoronitis

تهیه و تنظیم: دکتر خسرو سهرابی

خلاصه:

پری کورونیت یک اصطلاح و نمای کلینیکی است و عبارت است از التهاب یا عفونت بافت نرم پوشاننده تاج دندان نیمه‌نهفته یا نهفته، بنابراین شایع‌ترین دندان‌دانی که به پری کورونیت مبتلا می‌شود دندان مولر سوم فک پایین است. اصولاً پری کورونیت را از



نظر کلینیکی به سه دسته حاد، تحت حاد، و مزمن تقسیم بندی می‌کنند. درمان پری کورونیت شامل دو مرحله عمده می‌باشد، مرحله رفع علائم عفونت و مرحله تصمیم‌گیری در مورد دندان مبتلا، همچنین عوارض پری کورونیت را می‌توان به عوارض قبل از درمان و عوارض بعد از درمان تقسیم نمود.

مقدمه:

پری کورونیت یک اصطلاح و نمای کلینیکی است (۱) و عبارت است از التهاب یا عفونت بافت نرم پوشاننده یا سایورت‌دهنده، تاج دندان نیمه‌نهفته یا نهفته زیر مخاطی، معمولاً "مولر سوم فک پایین (۲). البته اغلب اوقات operculum روی سطح اکلوزال دندان‌دانی که بطور کامل رویش یافته (اصولاً "مولر سوم پایین) دچار التهاب و عفونت می‌شود که در مقالات قدیمی به این حالت operculitis می‌گفتند ولی امروزه این اصطلاح کمتر به کار برده می‌شود و چون این عفونت نیز بیشتر در ارتباط با دندان مولر سوم فک پایین دیده می‌شود آنرا جزء پری کورونیت به حساب می‌آورند (۳).

ایتولوژی:

علیرغم شیوع پری کورونیت ایتولوژی این بیماری بطور کامل و دقیق روشن نیست (۴)