

میگزوم دهلیز راست با تظاهر بالینی انفارکتوس ریوی

دکتر مراد هاشم‌زهی^۱ - دکتر مصطفی احمدی^۲ - مهین اسماعیلی مطلق^۳

چکیده

اگرچه تومور قلب، یافته نادری است ولی میگزوم قلبی شایع‌ترین تومور اولیه قلبی در بالغین (۵۰٪ تا ۷۰٪ همه تومورهای قلب) می‌باشد. میگزوم، تومور خوش‌خیمی است که در هر کدام از حفره‌های قلب می‌تواند ظاهر شود ولی در ۷۵٪ موارد در دهلیز چپ با بروز کلی ۰/۵ به ازای هر میلیون نفر در سال دیده می‌شود. امروزه اکوکاردیوگرافی با توجه به ارزش بالای تشخیصی و درمان زودرس و نتیجتاً درمان جراحی بموقع نقش عمده‌ای در جلوگیری از عوارض تهدیدکننده حیات در بیمار ایفا می‌نماید. میگزوم‌های منشأ گرفته از دریچه‌های قلب، بخصوص دهلیز راست در سرتاسر دنیا نادر (کمتر از ده مورد) گزارش شده است. در این گزارش بیمار جوانی معرفی می‌شود که با تظاهر درد پلورتیک قفسه صدری به واسطه انفارکتوس ریوی در اثر پرتاب آمبولی به شریان‌های ریه مراجعه و در بیمارستان بستری شد. مشاهدات و یافته‌های جالب حین عمل جراحی، منشأگیری تومور از لت دیواره‌ای دریچه سه‌لته قلب با تهاجم ضایعات ویلوس به بطن راست می‌باشند.

واژه‌های کلیدی: تومور قلب؛ میگزوم دهلیز؛ انفارکتوس ریوی

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (دوره ۱۶؛ شماره ۱؛ بهار ۱۳۸۸)

دریافت: ۱۳۸۷/۱۰/۰۴ اصلاح نهایی: ۱۳۸۸/۰۱/۱۵ پذیرش: ۱۳۸۸/۰۲/۰۱

^۱ نویسنده مسؤول؛ فوق تخصص جراحی قلب و عروق؛ دانشیار گروه آموزشی جراحی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

آدرس: بیرجند- خیابان غفاری- بیمارستان ولی عصر (عج)- بخش جراحی قلب

تلفن: ۰۵۶۱-۴۴۴۳۰۰۱-۹؛ شماره: ۰۵۶۱-۴۴۳۰۰۷۶؛ پست الکترونیکی: m_hashemzahi@yahoo.com

^۲ متخصص بیماریهای قلب و عروق؛ بیمارستان ولی عصر (عج)، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

^۳ کارشناس پرستاری؛ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیمارستان ولی عصر (عج)، بخش مراقبتهای ویژه جراحی قلب