



CASE REPORT

هرنی جدار شکم به دنبال ترومای بلانت شکمی

دکتر جمال جعفری ندوشن*^۱، دکتر ناصر آقائی^۲، دکتر محمد حسین مقصودیان^۳، فرشته رحیمی^۴، حمیده برزگر^۵

۱- متخصص جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

۲- متخصص بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

۳- پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

۴- کارشناس ریاضی و آمار

۵- کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

تاریخ پذیرش: ۱۳۸۸/۴/۱۸

تاریخ دریافت: ۱۳۸۷/۱۱/۱۴

چکیده

هرنی تروماتیک شکمی از موارد نادر به دنبال ترومای بلانت شکمی می‌باشد. تشخیص این پاتولوژی نادر بسیار مشکل است و اکثراً حین لاپاراتومی یا لاپاراسکوپی تشخیص داده می‌شود. در مواردی که بیمار بدلائل دیگر و جهت تشخیص ترومای بلانت کبد و طحال و دیگر ارگانهای توپر شکم سی تی اسکن می‌شود به صورت اتفاقی تشخیص داده می‌شود. البته در بعضی موارد نیز تشخیص با تأخیر است. تأخیر در تشخیص ممکن است باعث عوارض زیادی برای بیمار شود. از خطرناکترین آنها می‌توان به نکروز ارگان گیر افتاده در فتق اشاره کرد. این مقاله گزارش یک مورد فتق تروماتیک شکمی است که به دنبال ترومای شدید رخ داده است.

واژه‌های کلیدی: هرنی، تروما

* نویسنده مسئول؛ تلفن: ۰۳۵۱-۶۲۶۰۰۰۱-۹؛ پست الکترونیکی: jamalnedooshan@yahoo.com