

مقایسه رابطه مولفه های سلامت روانشناختی بیماران ام اس و همتایان عادی آن

سید ابوالقاسم سیدان، معصومه خوشحال، زهرا عسکری

چکیده

مقاله حاضر با هدف مقایسه سلامت روانشناختی بیماران ام اس و افراد سالم در جامعه آماری بیماران ام اس تربت حیدریه و همتایان سالم شهرستان با حجم (بیماران ۱۱۰ نفر و ۳۰۰۰۰ هزار نفر سالم) و بین سنین (۲۰ تا ۴۰) و روش نمونه گیری تصادفی و حجم (نمونه ۱۰۰ نفر و ۵۰ نفر بیمار و ۵۰ نفر سالم) و با استفاده از پرسشنامه (SCL90R) و روش پژوهشی توصیفی مقایسه ای اجرا و به این یافته کلی دست یافته که در عوامل شکایت جسمانی-وسواس-افسردگی-اضطراب-روان گسسته گرایی-تفاوت دیده شده معنا دار است و میانگین افراد ام اس بالاتر بوده و در فاکتور های حساسیت در روابط متقابل پرخاشگری-ترس مرضی-وافکار پارانویدی-تفاوت معنی دار نمیباشد.

کلمات کلیدی: ام اس-سلامت روان-شکایت جسمانی-وسواس اجباری-حساسیت در روابط متقابل-افسردگی-

اضطراب-پرخاشگری-ترس مرضی-پارانویا-روان گسست گرایی