

۸ تیر ماه ۱۳۹۶
29 Jun 2017

ایران، تهران، دانشگاه تهران
Iran, Tehran - Tehran University

کنگره بین المللی
مدیریت بهداشت روان و علوم روانشناختی

World Congress on Management of
Mental Health and Psychological Sciences

WCMMPs

مقایسه افکار خودکشی در بین بیماران مبتلا به نارسایی کلیه (بیماران دیالیزی) و ام-اس

compare suicidal thoughts in patients with Kidney failure(Dialysis patient) and MS

منیژه کمالی

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

manijekamali2@gmail.com

غلامرضا منشی*

دانشیار گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

smanshaee@yahoo.com

چکیده

بیماری های مزمن سبب پدید آیی آسیب های روان شناختی گوناگون در افراد مبتلا می گردد. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر مقایسه افکار خودکشی در بین بیماران مبتلا به نارسایی کلیه(بیماران دیالیزی) و ام-اس بود. طرح پژوهش، یک مطالعه علمی-مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه بیماران نارسایی کلیه(بیماران دیالیزی) و ام-اس شهر اصفهان در سال ۱۳۹۴ می باشد که حجم نمونه گیری پژوهش ۳۰ نفر بیماران نارسایی کلیه (بیماران دیالیزی) و ۳۰ نفر بیماران مبتلا به ام-اس به صورت نمونه گیری در دسترس از جامعه یاد شده انتخاب شدند. بیماران پرسشنامه مقیاس بک برای افکار خودکشی (بک، کوواس، ویسمن، ۱۹۹۷) را را به عنوان ابزار پژوهش جواب دادند. داده ها توسط آزمون تحلیل واریانس یک طرفه ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله بسته نرم افزاری SPSS24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین افکار خودکشی بیماران نارسایی کلیه(بیماران دیالیزی) و ام-اس تفاوت معنادار وجود دارد($p \leq 0.05$). بدین صورت که بیماران نارسایی کلیه(بیماران دیالیزی) نسبت به بیماران ام اس از افکار خودکشی بالاتری برخوردارند. یافته های این پژوهش از تفاوت بین افکار خودکشی بین بیماران نارسایی کلیه(بیماران دیالیزی) و ام-اس حمایت می کند.

واژگان کلیدی: افکار خودکشی، نارسایی مزمن کلیه(بیماران دیالیزی)، ام-اس