

۸ تیر ماه ۱۳۹۶
29 Jun 2017

ایران، تهران، دانشگاه تهران
Iran, Tehran - Tehran University

کنگره بین المللی
مدیریت بهداشت روان و علوم روانشناختی

World Congress on Management of
Mental Health and Psychological Sciences

WCMMPs

مقایسه خودکارآمدی درد در بین بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا و نارسایی کلیه (بیماران دیالیزی)

compare pain self-efficacy in patients with Fibromyalgia, Kidney failure(Dialysis patient)

منیژه کمالی

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

manijekamali2@gmail.com

غلامرضا منشی*

دانشیار گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

smanshaee@yahoo.com

چکیده

بیماری های مزمن سبب پدید آیی آسیب های روان شناختی گوناگون در افراد مبتلا می گردد. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر مقایسه خودکارآمدی درد در بین بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا و نارسایی کلیه (بیماران دیالیزی) بود. طرح پژوهش، یک مطالعه علمی-مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه بیماران فیبرومیالژیا و بیماران نارسایی کلیه (بیماران دیالیزی) اصفهان در سال ۱۳۹۴ می باشد که حجم نمونه گیری پژوهش ۳۰ نفر بیماران فیبرومیالژیا و ۳۰ نفر بیماران نارسایی کلیه (بیماران دیالیزی) به صورت نمونه گیری در دسترس از جامعه یاد شده انتخاب شدند. بیماران پرسشنامه خودکارآمدی درد (نیکولاس کی، ۱۹۸۹) را را به عنوان ابزار پژوهش جواب دادند. داده ها توسط آزمون تحلیل واریانس یک طرفه ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله بسته نرم افزاری SPSS24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین خودکارآمدی بیماران فیبرومیالژیا و نارسایی کلیه (بیماران دیالیزی) تفاوت معنادار وجود دارد ($p \leq 0.05$). بیماران فیبرومیالژیا نسبت به بیماران مبتلا به نارسایی کلیه (بیماران دیالیزی) از خودکارآمدی درد بالاتری برخوردارند. یافته های این پژوهش از تفاوت بین خودکارآمدی درد بین بیماران فیبرومیالژیا و نارسایی کلیه (بیماران دیالیزی) حمایت می کند.

واژگان کلیدی: خودکارآمدی درد، فیبرومیالژیا، نارسایی مزمن کلیه (بیماران دیالیزی)