

بررسی مقایسه‌ای حافظه سازا (تروماتیک) و طرح‌واره‌های ناسازگار در بین زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان عادی^۱

فرشته رضا^۱، علیرضا پیرخانی^۲

^۱. گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سمنان، ایران

^۲. گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سمنان، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

سرطان پستان شایع‌ترین سرطان زنان است که جنبه‌های مختلف سلامت فردی، از جمله سلامت روان را به مخاطره می‌اندازد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی مقایسه حافظه سازا (تروماتیک) و طرح‌واره‌های ناسازگار در زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان عادی بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده‌ها توصیفی و علی-مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان مبتلا به سرطان پستان بیمارستان شهدای تجریش شهر تهران می‌باشد. نمونه این پژوهش ۳۵ بیمار مبتلا به سرطان پستان و ۳۵ فرد بهنجار بودند که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه طرح‌واره ناسازگار اولیه فرم کوتاه و پرسش‌نامه فهرست تجارب تروماتیک استفاده شد. جهت تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چندمتغیره (مانووا) با استفاده از نرم افزار SPSS24 استفاده شد. یافته‌های حاصل از تحلیل واریانس نشان داد که میانگین نمرات طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و حافظه سازا در زنان با سرطان پستان، از زنان بهنجار به طور معنی‌داری متفاوت است، به عبارت دیگر بین زنان دارای سرطان پستان و زنان عادی از نظر میزان طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و حافظه سازا تفاوت معنی‌داری وجود دارد ($p < 0/05$). این یافته‌ها بیان می‌دارند که زنان با سرطان پستان طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و حافظه سازا مختل‌تری دارند. هم‌چنین این یافته‌ها تلویحات مهمی را در زمینه آسیب‌شناسی روانی و درمان این بیماران دارند.

واژه‌های کلیدی: طرح‌واره ناسازگار اولیه، حافظه سازا، سرطان پستان