

## بررسی رابطه ی اعتیاد مادران باردار بر سقط جنین

زهرا کرباسیان<sup>۱</sup>

<sup>۱</sup> دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاداسلامی واحد جنوب تهران

### چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی اعتیاد مادر با سقط جنین پرداخته است. جامعه مورد مطالعه در تحقیق حاضر عبارتند از زنان معتاد باردار مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد. با توجه به جامعه مورد مطالعه و برآورد حجم نمونه در حدود ۴۰ نفر است. که آزمون مقیاس آمادگی به اعتیاد توسط وید و بوچر (۱۹۹۲) بر روی آنها اجرا گردیده است. که نتایج ذیل را در بر داشت: میانگین آمادگی به اعتیاد در زنان باردار سقط جنین برابر با ۱۸۸ و انحراف معیار آن ۱۰/۰۵۳ و تعداد آنها ۲۶ نفر بوده اند و میانگین آمادگی به اعتیاد زنان بدون سقط جنین برابر با ۱۱۲ و انحراف معیار ۱۲/۱۰۵ و تعداد آنها ۱۴ نفر بوده است. میانگین رفتار ضد اجتماعی در زنان با سقط ۴/۴ و انحراف معیار آن ۰/۸ و میانگین رفتار ضد اجتماعی در زنان بدون سقط ۲/۴ و انحراف استاندارد آن ۳/۵۲ بود. میانگین میل به مصرف مواد در زنان بدون سقط برابر با ۳/۳ و میانگین میل به مصرف مواد در زنان بدون سقط ۲/۳ بود. همانطور که در نتایج یافته شده نشان می دهد که مصرف مخدر در نوعی موجب سقط و یا آسیب جدی به جنین می شود.

واژه های کلیدی: اعتیاد، معتاد، زنان معتاد، سقط جنین